

診療科 乳腺外科

分類 early breast cancer

1 / 1

レジメンNo. 09-SB015

休薬期間 20日

最大回数 1回

レジメン名称 trastuzumab(q3w)療法(初回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		11:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 90分かけて トラスツマブBS点滴静注用(60mg)[ハーセプチン] 注射用水 20ml 生理食塩液ソフトバッグ(大塚) 250ml	8mg 2A 1袋	/kg	12:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科		分類 early breast cancer		1 / 1						
レジメンNo. 09-SB016		休薬期間 20日		最大回数 18回						
レジメン名称		trastuzumab (q3w) 療法 (2回目以降)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 P L (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		11:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて トラスツマブ BS点滴静注用 (60mg) [ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液ソフトバッグ (大塚) 250ml	6mg 2A 1袋	/kg	12:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 P L (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:30						
―― 終了 ――										
レジメンコメント (医師専用)										