

診療科 乳腺外科		分類 MBC (Hなし) 進行再発乳癌		1 / 1						
レジメンNo. 11-SB0131		休薬期間 6日		最大回数 999回						
レジメン名称		weeklyPTX + Bevacizumab療法 (day1)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) ルートアップ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 5分かけて ポラミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー)	50ml	2A 1瓶	09:25						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカドロン] グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー)	50ml	1瓶 1A 1A 1瓶	09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて 生理食塩液PL (フソー)	50ml	1瓶	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」 [タキソール] 5% ブドウ糖液 250ml インラインフィルター使用		90mg /ml 1袋	10:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて 生理食塩液PL (フソー)	50ml	1瓶	11:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて アバスチン点滴静注用 (100mg-4mL) Bevacizumabは2週に1回投与 生理食塩液PL (フソー) 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可	100ml	10mg /kg 1瓶	12:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) フラッシュ	50ml	1瓶	13:30						
―― 終了 ――										
レジメンコメント (医師専用)										

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Hなし) 進行再発乳癌

1 / 1

レジメンNo. 11-SB0132

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 weeklyPTX + Bevacizumab療法 (day8)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 5分かけて ポラミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	50ml	2A 1瓶	09:25						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ト'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50ml	50ml	1瓶	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 5% ブドウ糖液 250ml インラインフィルター使用		90mg /m ² 1袋	10:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	11:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Hなし) 進行再発乳癌

1 / 1

レジメンNo. 11-SB0133

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 weeklyPTX + Bevacizumab療法 (day15)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 5分かけて ポララミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	2A 1瓶		09:25						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキササート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カト'ロン] グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶 1A 1A 1瓶		09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶		10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」 [タキソール] 5% ブドウ糖液 250ml インラインフィルター使用	90mg 1袋	/m ²	10:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶		11:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて アバスタチン点滴静注用 (100mg-4mL) Bevacizumabは2週に1回投与 生理食塩液PL (フソー) 100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可	10mg 1瓶	/kg	12:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)