

|                                          |  |          |  |                  |  |       |  |
|------------------------------------------|--|----------|--|------------------|--|-------|--|
| 診療科 血液腫瘍内科                               |  | 分類 リンパ腫  |  | 2021/05/28 10:47 |  | 1 / 1 |  |
| レジメンNo. 10-IG035                         |  | 休薬期間 26日 |  | 最大回数 999回        |  |       |  |
| レジメン名称 Rituximab+Bendamustine(day 1、2)療法 |  |          |  |                  |  |       |  |

| RpNo                                    | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                                       | 1回投与量  | 速度指示          | day ( 1 ) | day ( 2 ) | day ( 3 ) | day ( 4 ) | day ( 5 ) | day ( 6 ) | day ( 7 ) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01                                      | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液PL (フソー) 100m l<br>ルートキープ                                                                                                  | 1瓶     |               | 09:30     | 09:30     |           |           |           |           |           |
| 02                                      | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>100m l / h<br>リツキシマブBS点滴静注「500mg-50mL」 375mg /m <sup>2</sup><br>生理食塩液「テルモ」 500m l 1袋<br>初回50ml/h開始,以降100ml/h開始可.30分毎速め最速400ml/h |        |               | 10:00     |           |           |           |           |           |           |
| 03                                      | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>全開で<br>グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトル] 1A<br>生理食塩液PL (フソー) 50m l 1瓶                                                                 |        |               | 13:00     | 10:00     |           |           |           |           |           |
| 04                                      | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>60 分かけて<br>トレアキシシン点滴静注液 (100mg-4mL) 90mg /m <sup>2</sup><br>生理食塩液ワトバツグ (大塚) 250m l 1袋                                           |        |               | 13:30     | 10:30     |           |           |           |           |           |
| 05                                      | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液PL (フソー) 50m l 1瓶<br>フラッシュ                                                                                                 |        |               | 14:30     | 11:30     |           |           |           |           |           |
| 01                                      | カロナール錠 (200mg)<br>内) d-カルフェニラシマレイン酸塩錠 (2mg)<br>分1: 朝食後<br>リツキサン投与30分前に服用                                                                          | 2<br>1 | T<br>T<br>1日分 | ●         |           |           |           |           |           |           |
| <div> <div>終了</div> <div> </div> </div> |                                                                                                                                                   |        |               |           |           |           |           |           |           |           |
| <div> <div>レジメンコメント(医師専用)</div> </div>  |                                                                                                                                                   |        |               |           |           |           |           |           |           |           |