

1 / 3

最大回数 6回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 5%ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	持続末梢静脈維持ルートから 100ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL) [カイトリル] 5%ブドウ糖液 50ml	1A 1瓶		10:30						
03	持続末梢静脈維持ルートから 100ml/h サイメリン(50mg) 5%ブドウ糖液 100ml	80mg 1瓶	/㎡	11:00						
05	持続末梢静脈維持ルートから 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		12:00						
	続きあり									

・6～8週間間隔で最大6回まで実施する

診療科 脳神経外科

分類 Glioma

2 / 3

レジメンNo. 09-SN008

休薬期間 7日

最大回数 6回

レジメン名称 PMV療法 (day1~28)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 5% ブドウ糖液 50ml	1A 1瓶		10:30						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 全開投与 オンコビン (1mg) 5% ブドウ糖液 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:10						
01	塩酸プロカルバジンカプセル (50mg) 2 分2:朝・夕 食後	C	7日分	●	→	→	→	→	→	→
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

・6~8週間間隔で最大6回まで実施する

3 / 3

最大回数 6回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	塩酸プロカルバジンカプセル (50mg) 分2: 朝・夕 食後	2	C 7日分	●	→	→	→	→	→	→
終了										

・6～8週間間隔で最大6回まで実施する

診療科 脳神経外科

分類 Glioma

1 / 1

レジメンNo. 09-SN009

休薬期間 13日

最大回数 6回

レジメン名称 PMV療法 (day29~42)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/30分かけて グラニセロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 5% ブドウ糖液 50ml	1A 1瓶		10:30						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 全開投与 オンコビン (1mg) 5% ブドウ糖液 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:10						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

・オンコビンはday29に投与

・day22~28は休薬

・6~8週間間隔で最大6回まで実施する