

診療科 泌尿器科		分類 化学療法		1 / 1						
レジメンNo. 18-UR001		休薬期間 20日		最大回数 5回						
レジメン名称		Nivolumab+Ipilimumab療法								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 30分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管点滴静注で 200ml/h/30分かけて オブジーボ点滴静注「240mg-24mL」 生理食塩液PL(フソー) 100ml インラインフィルター使用。	240mg 1瓶	/Body	10:00						
03	末梢静脈側管点滴静注で 30分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管点滴静注で 60ml/h/30分かけて ヤーボイ点滴静注液(50mg-10mL) 生理食塩液PL(フソー) 50ml 薬剤注入量分生食廃棄し全量30mL(最終濃度1~4mg/mL)に調製、インラインフィルター使用。	1mg 30ml	/kg	11:00						
05	末梢静脈側管点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用)										