

診療科 婦人科

分類 入院外来共通

1 / 1

レジメンNo. 10-GY0053

休薬期間 27日

最大回数 999回

レジメン名称 ★Liposomal doxorubicin+CBDCA療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	10:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 5%ブドウ糖液 100ml		1瓶 1瓶 2A 1瓶	10:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 167ml/h/90 分かけて ドキシル注(20mg-10ml) 5%ブドウ糖液 250ml		30mg /m ² 1袋	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶	12:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて カルボプラチン点滴静注<450mg-45mL>[ハアラチン] 5%ブドウ糖液 250ml AUC5~6		5mg /GFR+25 1袋	13:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラグジュ		1瓶	14:00						
—— 終了 ——										

レジメンコメント(医師専用)