

診療科 婦人科

分類 入院外来共通

1 / 1

レジメンNo. 09-GY1233

休薬期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 ★TC療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて ガスター注射液「20mg-2mL」 デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ポララミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 3瓶 2A 1瓶		09:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1瓶		09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 166ml/h/180分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキセル] 生理食塩液PL(フソー) 500ml インラインフィルターを使用。	180mg 1瓶	/m ²	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて カルセプト点滴静注液<450mg-45mL>[カルセプト] 5%ブドウ糖液 250ml	6mg 1袋	/GFR+25	13:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)