

診療科 婦人科

分類 入院外来共通 卵巣癌

1 / 1

レジメンNo. 14-GY0033

休薬期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 ★卵巣癌 TC+Bevacizumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	08:45						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて ガスター注射液「20mg-2mL」 デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ト'ン] ポラミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1A 3瓶 2A 1瓶	09:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて アロキシ静注 (0.75mg-5ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 1瓶	09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 170ml/h/180分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」 [タキ'セル] 生理食塩液PL (フソー) 500ml インラインフィルターを使用。		175mg /m ² 1瓶	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて カル'ブ'ラチ点滴静注液<450mg-45mL> [ハ'ラ'ブ'ラチ 5% ブドウ糖液 250ml		6mg /GFR+25 1袋	13:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 初回は90分かけて アバスチン点滴静注用 (100mg-4mL) 生理食塩液PL (フソー) 100ml 初回90分、初回問題なければ2回目60分、問題なければ3回目以降30分		15mg /kg 1瓶	14:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	15:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)