

診療科 婦人科

分類 入院外来共通

1 / 1

レジメンNo. 09-GY1242

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 weekly TC療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15 分かけて ガスター注射液「20mg-2mL」 デキサー注射液(1.65mg-0.5mL) [デカトロン] デキサー注射液「6.6mg-2mL」 [デカトロン] ポラミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 2A 1瓶 2A 1瓶		09:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」 [タキソール] 5% ブドウ糖液 250ml インラインフィルターを使用。	60mg 1袋	/m ²	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて カルボプラチン点滴静注液<450mg-45mL> [ハルプラチン] 5% ブドウ糖液 250ml	2mg 1袋	/GFR+25	11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)